

養和內鏡中心

本中心由經驗豐富的內鏡專科醫生主理，以最先進的內視鏡攝影儀器，為消化道、膽胰及呼吸系統疾病的患者提供優質的診斷及治療服務。本中心可安排麻醉科醫生為病者施行監測麻醉，將病者在檢查期間可能出現之不適減至最低。

檢查後，專科醫生會即時告訴你檢查結果。如曾取出組織切片作化驗，檢查報告將於2至3個工作天完成，隨後專科醫生或主診醫生將約見病者解釋報告及治療。

養和內鏡中心

跑馬地

養和醫院

香港跑馬地山村道2號李樹培院15樓

電話：(852) 2835 8623

傳真：(852) 2892 7529

endo@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

辦公時間


星期一至星期六：上午八時至下午四時

星期日及公眾假期休息

敬請預約



支氣管鏡檢查



查詢或預約，歡迎聯絡我們

支氣管鏡檢查

支氣管鏡檢查是醫生把一支纖幼、可屈曲、末端裝有光源及微型攝影機的支氣管鏡(約鉛筆般粗幼)，經病者的鼻或口放入呼吸道，以觀察病者的呼吸道內壁。這項檢查有助於診斷腫塊、肺炎、咳血等肺部病症，及找出肺部X光檢查結果不正常的原因。檢查進行期間，醫生可同時取出呼吸道分泌物及/或活組織，並交作病理化驗。

誰人應接受支氣管鏡檢查？

如有以下情況，便應接受支氣管鏡檢查：


- 持續咳嗽
- 呼吸困難
- 咳血
- 肺部X光檢查結果不正常
- 吸入異物
- 肺炎歷久不退

應如何準備？

- 檢查前須禁食最少6至8小時(包括食物及飲料)
- 請於檢查前取出假牙

檢查是怎樣進行？

- 檢查前，醫生可能會為你作靜脈或肌肉注射鎮靜劑，以減輕檢查期間可能出現之不適，以及令你在檢查進行期間入睡
- 醫生一般會在你的鼻及口部噴上局部麻醉藥，以減輕支氣管鏡進入喉部時的不適及檢查期間可能會出現的作嘔感覺
- 檢查期間，你會仰臥在檢查床上，醫護人員會用枕頭墊著你的肩及頸，並為你提供氧氣吸入(利用鼻導管或氧氣罩)
- 醫生會把可屈曲的支氣管鏡經你的鼻或口放入呼吸道
- 醫生把支氣管鏡放進你的上呼吸道後，會先檢查你的聲帶，然後繼續把支氣管鏡向前推進你的氣管及支氣管內
- 檢查進行時，如醫生發現你的呼吸道有不正常的地方，便可能會取一小片組織作化驗
- 這項檢查需時約20分鐘



檢查後注意事項

- 檢查後，護士會觀察你的情況。如你的情況穩定及神志清醒，便可離開
- 如檢查時曾注射鎮靜藥物，可能有暈眩的感覺，必須由成年親友陪同下方可離開。檢查後24小時內，請勿駕駛、踏單車、操作機械或飲用任何含有酒精之飲料
- 如檢查時曾使用局部麻醉藥，你的口部一般會出現苦澀的味道，並令你感到喉部腫脹及吞嚥困難。檢查後數天內，你也可能會感到喉痛及聲音嘶啞。這些不適的感覺會逐漸減退。如不適的感覺持續，請通知主診醫生