


使用眼藥水及眼藥膏的方法

1. 使用眼藥前，請先洗手。
2. 使用眼藥時，頭向後仰。
3. 用手指將下眼瞼向下輕拉，眼向上望：
眼藥水：滴1至2滴於下眼瞼穹窿內。(圖一)
眼藥膏：擠出2至3毫米及塗於下眼瞼穹窿內。(圖二)
4. 閉上眼睛，用紙巾拭去眼外多餘的藥水或藥膏，及以食指頭輕輕按壓內眼角約一分鐘。
5. 使用眼藥水或眼藥膏時，請勿讓瓶口接觸眼部。
6. 如使用兩種或以上的眼藥水，請相隔三至五分鐘。
7. 如同時使用眼藥水及眼藥膏，請先滴眼藥水，再塗眼藥膏。
8. 塗眼藥膏後，視力會出現短暫性模糊。
9. 使用眼藥後，請保持藥蓋緊閉及放置於陰涼處。避免陽光直接照射。
10. 必須遵照醫生的指示使用眼藥。



(圖一)



(圖二)

未開啟的眼藥水及眼藥膏均已消毒。請記下開啟藥瓶的日期。藥瓶開封一個月後請勿使用，並應立即棄掉；或可參考藥廠的用藥指示。

如出現過敏反應，請立即停用眼藥並通知主診醫生。

跑馬地
養和醫院
香港跑馬地山村道2號李樹芬院4樓
電話：(852)2835 8880；(852)2835 8890
傳真：(852)2892 7510
電郵：eye@hksh-hospital.com
服務時間
星期一至星期五：上午九時至下午五時
星期六：上午九時至下午一時
星期日及公眾假期休息
www.hksh-hospital.com

內容已採納病人意見

© 養和醫療集團有限公司 版權所有

金鐘
養和醫健專科中心
香港金鐘道88號太古廣場一座21樓
電話：(852)2855 6700
傳真：(852)2523 7660
電郵：eye@hksh-healthcare.com
服務時間
星期一至星期五：上午九時至下午五時
星期六：上午九時至下午一時
星期日及公眾假期休息
www.hksh-healthcare.com



歡迎瀏覽養和醫療
YouTube頻道
觀看「使用眼藥水及
眼藥膏篇」系列影片